

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 19-4-73 505473

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

Tél. 88-56-45

88-06-15

ABONNEMENT ANNUEL

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDEE, MAYENNE)

Poste 571

30 frs

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02 49043 ANGERS CEDEX

SUPPLEMENT N° 3 au BULLETIN N° 151 d'AVRIL 1973 - MAINE-et-LOIRE - VENDEE.....p. 15
SUPPLEMENT N° 4 au BULLETIN N° 151 d'AVRIL 1973 - LOIRE ATLANTIQUE-SARTHE-MAYENNE p. 17

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER

Les conditions climatiques continuent toujours à être peu favorables à la Tavelure du poirier et les projections d'ascospores sont encore faibles. Cependant depuis quelques jours la végétation s'est accrue; en particulier des feuilles non protégées se sont développées. En conséquence, dans tous les vergers de poiriers, il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement dès réception de cette note.

TAVELURE DU POMMIER

- Dans les vergers des départements de Maine-et-Loire, Loire Atlantique (sauf le Nord), de la Vendée et du Sud des départements de la Sarthe et de la Mayenne, les conditions sont également peu favorables à cette maladie et les projections d'ascospores sont également faibles. Toutefois, depuis le dernier traitement et sur certaines variétés, des feuilles se sont développées, ce qui nécessite l'application d'un nouveau traitement. Cependant, dans les exploitations où les arboriculteurs peuvent intervenir très vite, il est possible de repousser cette application à l'annonce d'un changement de temps.
- Dans les vergers du Nord des départements de la Loire Atlantique, du Nord de la Sarthe et du Nord de la Mayenne, terminer d'urgence le traitement conseillé dans la note du 13 Avril.
- Effectuer le premier traitement sur les variétés à débourrement tardif atteignant le stade C3 D.

OIDIUM DU POMMIER

Les germes de la maladie sont nombreux. En conséquence profiter du traitement anti-tavelure pour assurer une nouvelle protection.

MONILIA DU CERISIER ET DU PRUNIER - Effectuer un traitement à la chute des pétales.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER - Les projections d'ascospores deviennent plus importantes et il est souhaitable d'effectuer un nouveau traitement dans le courant de la semaine du 23 au 28 Avril. Cependant, les exploitants qui peuvent intervenir rapidement ont la possibilité d'attendre l'annonce d'un changement de temps.

PSYLLES DU POIRIER - Il est encore trop tôt pour intervenir.

PUCERONS - Quelques foyers de pucerons ont été observés. En cas de nécessité, profiter du traitement anti-tavelure pour intervenir contre eux.

ARAIGNEE ROUGE -

Aucune éclosion d'oeufs d'hiver n'a été constatée. En conséquence, il est encore beaucoup trop tôt pour intervenir contre les formes mobiles.

....//....

.....

MAINE-et-LOIRE - VENDEE..... p. 16
LOIRE ATLANTIQUE - SARTHE - MAYENNE.... p. 18

CHENILLES DEFOLIATRICES -

Dans les vergers attaqués au cours de l'an passé, observer la réapparition éventuelle de ces chenilles qui ont déjà été notées dans différentes exploitations. Intervenir en cas de nécessité.

PROTECTION DES ABEILLES

Il est rappelé que dans la mesure du possible, il est souhaitable d'éviter certains traitements pendant la floraison des arbres fruitiers. Si des traitements sont cependant effectués dans ces conditions, ils ne doivent mettre en oeuvre que des produits non toxiques pour les abeilles et être réalisés aux heures où ces insectes ne butinent pas.

Le Chef de la Circonscription
Phytosanitaire "PAYS DE LA LOIRE"

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles:

J. DIXMERAS

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 19 AVRIL 1973